

Pré-test

I-L'acné est une maladie :

- a. Inflammatoire
- b. Infectieuse
- c. Auto-immune
- d. Auto-inflammatoire
- e. Toutes ces réponses sont justes

2-Les facteurs incriminés dans la genèse de l'acné :

- a. Le kératinocyte du follicule pilosébacé
- b. La glande sébacée
- c. Propionibacterium acnes (bactérie aérobie)
- d. Le follicule pileux
- e. Toutes ces réponses sont justes

3-Dans la genese de l'acné intervient :

- a. Une séborrhée inconstante
- b. Une hyperkeratose de l'infundibulum du follicule pilosébacé
- c. Le Staphylococe épidermidis
- d. Le Propionibacterium acnes
- e. Toutes ces réponses sont justes

4-Parmi les traitements de l'acné, seul un seul est capable d'entraîner la guérison :

- a. Le peroxyde de benzoyl
- b. La trétinoïne
- c. L'isotrétinoïne per os
- d. Gluconate de zinc
- e. Aucune de ces réponses n'est juste

5-En cas de traitement d'acné, il y'a un risque d'échec thérapeutique en cas :

- a. Une séborrhée importante
- b. Un début tardif de l'acné
- c. Des antécédents familiaux d'acné
- d. Une extension des lésions au cuir chevelu
- e. Toutes ces réponses sont justes

6-Rétinoïdes topiques sont représentés par :

- a. trétinoïne
- b. isotrétinoïne
- c. adapalène
- d. peroxyde de benzoyl
- e. toutes ces réponses sont justes

7- l'isotretinoïne par voie orale

- a. Est tératogène
- b. Son association aux macrolides favorise l'apparition d'une HIC
- c. Il peut entraîner une hypertriglycémie
- d. Il peut entraîner une cytolysé hépatique
- e. Toutes ces réponses sont justes

8-Gluconate de zinc

- a. Activité anti-inflammatoire supérieure à celle des cyclines
- b. Nécessite une photoprotection car photosensibilisant
- c. Contre-indiqué en cas d'acné pré-pubertaire
- d. Contre indiqué en cas de grossesse
- e. Toutes ces réponses sont fausses

9-Isotrétinoïne per os est indiqué :

- a. D'emblée en cas d'acné sévère (stade 4) si risque cicatriciel ou récurrence rapide
- b. En cas d'acné de gravité moyenne (Grade 3) après échec d'un traitement combiné
- c. En cas d'acné légère (grade 2) après échec d'un trt combiné associé à des cyclines per os
- d. Toutes ces réponses sont justes
- e. Réponse ces réponses sont fausses

Réponses

I-L'acné est une maladie :

- a. Inflammatoire
- b. Infectieuse
- c. Auto-immune
- d. Auto-inflammatoire
- e. Toutes ces réponses sont justes

I-L'acné est une maladie :

- a. Inflammatoire
- b. Infectieuse
- c. Auto-immune
- d. Auto-inflammatoire
- e. Toutes ces réponses sont justes

2-Les facteurs incriminés dans la genèse de l'acné :

- a. Le kératinocyte du follicule pilosébacé
- b. La glande sébacée
- c. Propionibacterium acnes (bactérie aérobie)
- d. Le follicule pileux
- e. Toutes ces réponses sont justes

2-Les facteurs incriminés dans la genèse de l'acné :

- a. Le kératinocyte du follicule pilosébacé
- b. La glande sébacée
- c. Propionibacterium acnes (bactérie aérobie)
- d. Le follicule pileux
- e. Toutes ces réponses sont justes

3-Dans la genese de l'acné intervient :

- a. Une séborrhée inconstante
- b. Une hyperkeratose de l'infundibulum du follicule pilosébacé
- c. Le Staphylococe épidermidis
- d. Le Propionibacterium acnes
- e. Toutes ces réponses sont justes

3-Dans la genese de l'acné intervient :

- a. Une séborrhée inconstante
- b. Une hyperkeratose de l'infundibulum du follicule pilosébacé
- c. Le Staphylococe épidermidis
- d. Le Propionibacterium acnes
- e. Toutes ces réponses sont justes

4-Parmi les traitements de l'acné, seul un seul est capable d'entraîner la guérison :

- a. Le peroxyde de benzoyl
- b. La trétinoïne
- c. L'isotrétinoïne per os
- d. Gluconate de zinc
- e. Aucune de ces réponses n'est juste

4-Parmi les traitements de l'acné, seul un seul est capable d'entraîner la guérison :

- a. Le peroxyde de benzoyl
- b. La trétinoïne
- c. L'isotretinoïne per os
- d. Gluconate de zinc
- e. Aucune de ces réponses n'est juste

5-En cas de traitement d'acné, il y'a un risque d'échec thérapeutique en cas :

- a. Une séborrhée importante
- b. Un début tardif de l'acné
- c. Des antécédents familiaux d'acné
- d. Une extension des lésions au cuir chevelu
- e. Toutes ces réponses sont justes

5-En cas de traitement d'acné, il y'a un risque d'échec thérapeutique en cas :

- a. Une séborrhée importante
- b. Un début tardif de l'acné
- c. Des antécédents familiaux d'acné
- d. Une extension des lésions au cuir chevelu
- e. Toutes ces réponses sont justes

6-Rétinoïdes topiques sont représentés par :

- a. trétinoïne
- b. isotrétinoïne
- c. adapalène
- d. peroxyde de benzoyl
- e. toutes ces réponses sont justes

6-Rétinoïdes topiques sont représentés par :

- a. trétinoïne
- b. isotrétinoïne
- c. adapalène
- d. peroxyde de benzoyl
- e. toutes ces réponses sont justes

7- l'isotretinoïne par voie orale

- a. Est tératogène
- b. Son association aux macrolides favorise l'apparition d'une HIC
- c. Il peut entraîner une hypertriglycémie
- d. Il peut entraîner une cytolysé hépatique
- e. Toutes ces réponses sont justes

7- l'isotretinoïne par voie orale

- a. Est tératogène
- b. Son association aux macrolides favorise l'apparition d'une HIC
- c. Il peut entraîner une hypertriglycémie
- d. Il peut entraîner une cytolysé hépatique
- e. Toutes ces réponses sont justes

8-Gluconate de zinc

- a. Activité anti-inflammatoire supérieure à celle des cyclines
- b. Nécessite une photoprotection car photosensibilisant
- c. Contre-indiqué en cas d'acné pré-pubertaire
- d. Contre indiqué en cas de grossesse
- e. Toutes ces réponses sont fausses

8-Gluconate de zinc

- a. Activité anti-inflammatoire supérieure à celle des cyclines
- b. Nécessite une photoprotection car photosensibilisant
- c. Contre-indiqué en cas d'acné pré-pubertaire
- d. Contre indiqué en cas de grossesse
- e. **Toutes ces réponses sont fausses**

9-Isotrétinoïne per os est indiqué :

- a. D'emblée en cas d'acné sévère (stade 4) si risque cicatriciel important ou en cas de récurrence rapide
- b. En cas d'acné de gravité moyenne (Grade 3) après échec d'un traitement combiné
- c. En cas d'acné légère (grade 2) après échec d'un trt combiné associé à des cyclines per os
- d. Toutes ces réponses sont justes
- e. Réponse ces réponses sont fausses

9-Isotrétinoïne per os est indiqué :

- a. **D'emblée en cas d'acné sévère (stade 4)**
- b. En cas d'acné de gravité moyenne (Grade 3) après échec d'un traitement combiné
- c. En cas d'acné légère (grade 2) après échec d'un trt combiné associé à des cyclines per os
- d. Toutes ces réponses sont justes
- e. Réponse ces réponses sont fausses